



VESZPRÉM MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

## VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

A szőlő arany színű sárgaság betegséget okozó *Grapevine flavescence dorée* zárlati károsítót Veszprém megyében először 2013-ban, majd az azt követő években a Badacsony-hegyen és környékén azonosította be a Veszprém Megyei Kormányhivatal. A betegség visszaszorítása és továbbterjedésének megakadályozása érdekében növény-egészségügyi zárlat került elrendelésre a fertőzött területeken és a határaiktól számított 3 km sugarú részt pedig puffer zónának (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) jelölte ki.

A körülhatárolt területen található szőlőültetvényekben elvégzett felmérések szerint a szőlő arany színű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) lárvakelése 2019. év májusának harmadik hetében kezdődött meg, majd a következő héten második lárvastádiumú egyedek is megtalálhatóak voltak.

A kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca előfordulása esetén, egyedszámának visszaszorítása érdekében kötelező növény-védőszeres védekezéseket végezni, melyeket azok optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani.

A Veszprémi Járási Hivatal vizsgálatai alapján az első kezelést a szőlő virágzása után, de legkésőbb 2019. június 30. napjáig, a második kezelést, 2-3 hét múlva, de legkorábban július első felében kell elvégezni a körülhatárolt területen és a Balaton-felvidéki borvidék ezzel határos településein.

A kifejllett egyedek elleni harmadik kezelésre újabb védekezési felhívás kerül kiadásra a kabóca csapdák fogási eredménye alapján. Az eredményes növényvédelem feltétele, hogy a kötelező kezeléseket előtt a szőlőnövénysoron törzstisztítás elvégzésre kerüljön.

A csemege- és borszőlő állományokban a védekezésre alábbi táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók:

Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Forgalmazási kategória	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenosztádiuma
Bulldock 25 EC	II.	2	14 nap	érés kezdetéig (BBCH 81), de a fűrtkezdemények növekedésétől (BBCH 55) a virágzás végéig (BBCH 69) nem alkalmazható
Daskor	I.	1	-	fűrtzáródás (BBCH 79)
Roska	I.	1	-	fűrtzáródás (BBCH 79)
Decis	III.	2	14 nap	zsendülés (BBCH 85)
Decis Mega	II.	3	14 nap	zsendülés (BBCH 85)
Fendona 10 EC	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Eribea	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
King 10 F	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Littac Super	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Kaiso EG	II.	1	-	fűrtzáródás (BBCH 78)
Kaiso Garden	III.	1	-	fűrtzáródás (BBCH 78)
Karate Zeon 5 CS	III.	2	10 nap	fűrtzáródás (BBCH 78)
Laser	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)
Klartan 24 EW	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)
Spin Tor	II. ; III.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt amerikai (BBCH 84)
Sivanto Prime	II.	1	-	fűrtvirágzat nyúlása-zsendülés (BBCH57-81)
Reldan 22 EC	I.	2	7 nap	fűrtzáródás (BBCH 78)

Kérem a védekezést a betegség visszaszorítása és továbbterjedése érdekében soron kívül elvégezni szíveskedjenek.

Veszprém, 2019.05.29

Benczik Zsolt  
járási hivatalvezető  
névében és megbízásából:

Odor Tamás  
osztályvezető

